

Naam	Indicaties	Belangrijkste bijwerkingen	Risico afwijkingen bij ongeboren baby's	Opmerkingen
Brivaracetam (Briviact®)	Alle epilepsie vormen	Slaperigheid, prikkelbaarheid (minder dan levetiracetam)	Niet bekend	
Carbamazepine (Tegretol®)	focale aanvallen, tonisch-clonische aanvallen	Huiduitslag, slaperigheid, dubbelzien, evenwichts-klachten, hyponatriëmie	Relatief lage kans bij doseringen minder dan 400 mg/dag	Interacties: beïnvloedt vaak de werking van andere medicijnen.
Clobazam (Frisium®)	Alle aanvalstypes	Tolerantievorming (hoe vaker iemand het middel gebruikt hoe minder goed het werkt), slaperigheid	Relatief lage kans op aangeboren afwijkingen	Bij tijdelijke aanvalstoename.
Clonazepam (Rivotril®)	Alle aanvalstypes	Tolerantievorming, slaperigheid		Bij aanvalseries of tijdelijke aanvalstoename
Ethosuximide (Ethymal®):	Geen	Maag- en darmklachten, malaise	Niet bekend	Geen effect bij tonisch-clonische aanvallen
Felbamaat (Taloxa®)	3 ^e lijns middel: alleen voorgeschreven door epilepsiecentrum of academisch ziekenhuis	Aplastische anemie, leverstoornissen (hepatotoxiciteit), misselijkheid, gewichtsverlies, slapeloosheid	Niet bekend	(in het begin) regelmatige bloedcontroles
Fenobarbital	3 ^e lijns middel	Slaperigheid, coördinatiestoornissen, effecten op concentratie en geheugen; lange termijn effecten (contracturen, frozen shoulder)	Verhoogd	Interacties
Fenytoïne (Diphantoïne®)	Focale aanvallen, tonisch-clonische aanvallen	Slaperigheid (sedatie), huiduitslag, coördinatiestoornissen, lange termijn effecten (overmatige beharing, tandvleesgroei, polyneuropathie)	Verhoogd	Interacties
Gabapentine (Neurontin®)	Focale en tonisch-clonische aanvallen	Misselijkheid, malaise, gewichtstoename	Niet bekend	Minimaal 3x daags doseren
Lacosamide (Vimpat®)	Focale en tonisch-clonische aanvallen	Duizeligheid, dubbelzien, hoofdpijn	Nog onvoldoende gegevens bekend	
Lamotrigine (Lamictal®)	Alle aanvalstypes	Huiduitslag, slapeloosheid, trillen	Relatief laag bij doseringen tot 300 mg/dag	Langzaam opbouwen
Levetiracetam (Keppra®, Kevesy®, Matever®)	Partiële aanvallen, tonisch-clonische aanvallen	Slaperigheid, symptomen van griep/bovenste luchtweginfecties, prikkelbaarheid, prikkelbaarheid, effecten op stemming (zeldzaam)	Relatief laag	Bij psychiatrische voorgeschiedenis verhoogde kans op psychische bijwerkingen
Oxcarbazepine (Trileptal®)	Partiële aanvallen, tonisch-clonische aanvallen	Huiduitslag (minder vaak dan CBZ en in 25% kruisreactie), dubbelzien, evenwichts-klachten, hyponatriëmie	Relatief laag	
Topiramaat (Topamax®)	Alle typen epilepsie	Effecten op stemming en concentratie/geheugen, tintelingen, traagheid, gewichtsverlies, nierstenen (zeldzaam)	Verhoogd	Langzaam opbouwen
Valproaat (Depakine®)	Alle typen epilepsie	Trillen (tremor), meer eetlust, haaruitval; leverstoornissen (hepatotoxiciteit zeldzaam), cysten in de eierstokken (polycysteuze ovaria)	Verhoogd: zowel op aangeboren afwijkingen als op leerstoornissen bij het kind.	Niet geschikt voor jonge vrouwen
Vigabatrine (Sabril®)	Syndroom van West	Misselijkheid, slaperigheid, gezichtsveldbeperkingen (die niet meer verdwijnen), psychose	Verhoogd	Controles gezichtsvelden noodzakelijk.
Zonisamide (Zonegran®)	focale aanvallen, tonisch-clonische aanvallen	Slaperigheid, duizeligheid, effecten op stemming en concentratie/geheugen	Niet bekend	